

# Boletim Previsão – Açores



**Previsão alargada para as próximas 4 semanas  
no período de**

**24/02 a 23/03/2025**

**Data de referência: 19/02/2025**

## Conteúdos:

- 02 – 1ª Semana (24/02 a 02/03)
- 02 – 2ª Semana (03/03 a 09/03)
- 03 – 3ª Semana (10/03 a 16/03)
- 03 – 4ª Semana (17/03 a 23/03)
- 04 – Como Interpretar

## Resumo:

Na **precipitação total semanal**, prevêem-se valores **abaixo** do normal, para os grupos Ocidental e Oriental, na 1ª semana (de 24/02 a 02/03), com valores entre -30 a -1mm e para todo o arquipélago, nas 2ª e 4ª semanas (de 03/03 a 09/03 e de 17/03 a 23/03), com valores entre -10 e -1mm. Na 3ª semana (de 10/03 a 16/03) não é possível identificar a existência de sinal estatisticamente significativo.

## Produzido por:

Instituto Português do Mar e da Atmosfera, I.P., com base nas previsões do ECMWF.

Na **temperatura média semanal**, prevêem-se valores **acima** do normal, para todo o arquipélago, nas semanas de 24/02 a 02/03(+0.25 a 3°C), de 03/03 a 09/03(+0.25 a 3°C), de 10/03 a 16/03(+0.25 a 1°C) e de 17/03 a 23/03(+0.25 a 1°C).



## Disponível em:

[www.ipma.pt](http://www.ipma.pt)

**A previsão alargada apresenta cenários em termos probabilísticos.**

**A sua utilização deve ser feita com reservas, para a 2ª e em especial para as 3ª e 4ª semanas, declinando o IPMA quaisquer responsabilidades que resultem da sua utilização sem atender a estas reservas.**



## Análise – 1ª Semana (24/03 a 02/03):



**Precipitação Total Semanal:** Anomalia **negativa** (-30 a -1 mm) para os grupos Ocidental e Oriental, ao nível de significância de 99%, no grupo Ocidental. A probabilidade da precipitação total semanal ser **inferior** ao normal situa-se entre 50-60%.

**Temperatura Média Semanal:** Anomalia **positiva** (0.25a 3°C) para todo o arquipélago ao nível de significância de 99%. A probabilidade da temperatura média semanal ser **superior** ao normal situa-se entre 80-100%.



## Análise – 2ª Semana (03/03 a 09/03):



**Precipitação Total Semanal:** Anomalia **negativa** (-10 a -1 mm) para todo o arquipélago, ao nível de significância de 99%. A probabilidade da precipitação total semanal ser **inferior** ao normal situa-se entre 30-60%.

**Temperatura Média Semanal:** Anomalia **positiva** (+0.25 a 3°C) para todo o arquipélago, ao nível de significância de 99%. A probabilidade da temperatura média semanal ser **superior** ao normal situa-se entre 70-90%.



### Análise – 3ª Semana (10/03 a 16/03):



**Precipitação Total Semanal:** Não é possível identificar a existência de sinal estatisticamente significativo

**Temperatura Média Semanal:** Anomalia **positiva** (+0.25 a 1°C) para todo o arquipélago, ao nível de significância de 99%. A probabilidade da temperatura média semanal ser **superior** ao normal situa-se entre 50-70%.

### Análise – 4ª Semana (17/03 a 23/03):



**Precipitação Total Semanal:** Anomalia **negativa** (-10 a -1 mm) para todo o arquipélago, ao nível de significância de 99%, nos grupos Ocidental e Oriental. A probabilidade da precipitação total semanal ser **inferior** ao normal situa-se entre 40-60%.

**Temperatura Média Semanal:** Anomalia **positiva** (+0.25 a 1°C) para todo o arquipélago, ao nível de significância de 99%. A probabilidade da temperatura média semanal ser **superior** ao normal situa-se entre 40-70%.

## Como Interpretar:

A previsão alargada tem como base o modelo do Centro Europeu de Previsão a Médio Prazo (ECMWF) que resulta da combinação de características da previsão a médio prazo (até 10 dias) com características das previsões sazonais. Esta combinação baseia-se no pressuposto de que um período de tempo de 10 a 30 dias é suficientemente curto para que a atmosfera retenha informação sobre as condições iniciais e é suficientemente longo para que a variabilidade do oceano influencie a circulação atmosférica.

A previsão alargada é efetuada com 101 membros do *ensemble*, sendo a climatologia que serve de base obtida com 90 membros para os últimos 20 anos.

As previsões alargadas baseiam-se essencialmente na análise das anomalias médias no *ensemble* e da distribuição de probabilidades para os parâmetros precipitação e temperatura do ar a 2m.

As anomalias representam médias das diferenças entre os resultados obtidos por cada membro do *ensemble* e a climatologia do modelo (média nos últimos 20 anos) e indicam valores acima (anomalias positivas) ou abaixo (anomalias negativas) do normal (climatologia).

As anomalias são acompanhadas de um teste estatístico que compara as distribuições de probabilidade do *ensemble* de cada previsão alargada e da climatologia. Nas regiões onde a significância estatística é inferior a 90%, diz-se que a anomalia não é estatisticamente significativa, ou seja, que a previsão não é conclusiva.

A distribuição de probabilidades indica se há maior ou menor concordância entre os membros do *ensemble* e permite associar um grau de confiança à previsão. Se todos os membros do *ensemble* apontarem para um determinado cenário, a probabilidade a ele associada é maior e a confiança na previsão é maior. Se existir uma grande dispersão dos membros do *ensemble* pelos vários cenários possíveis, a probabilidade associada a cada cenário é menor e a confiança na previsão é menor.

A previsão alargada corresponde a um produto em fase de desenvolvimento e apresenta cenários em termos probabilísticos. A sua utilização deve ser feita com reservas, em especial para a 2ª, 3ª e 4ª semanas, em que não existe aptidão da previsão para os padrões de tempo de larga escala e o erro da previsão é igual ao de uma previsão baseada numa média climatológica.

Quando, na análise dos tercis, se quantifica a probabilidade de ter valores superiores ou inferiores ao normal deve-se interpretar “normal” como pertencendo ao intervalo entre 33% e 66%, ou seja, inferior ao normal significa inferior a 33%, superior ao normal significa superior a 66%.